

HANTAVIRUS

¿Qué es?

El hantavirus es una **enfermedad viral aguda grave**, causada por el virus Hanta. Los **ratones silvestres (principalmente los de cola larga) lo transmiten a las personas**, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

¿Cómo se transmite?

Puede transmitirse de diversas maneras:

Por inhalación: Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados contaminados por las heces o la orina de los roedores infectados.

Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos infectados, o sus heces u orina.

Por mordeduras: Al ser mordidos por roedores infectados.

Por vía interhumana: A través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de síntomas, a través de la vía aérea.

¿Cuáles son los síntomas?

Son **similares a los de un estado gripal**. Puede causar dificultad respiratoria y **producir un "síndrome cardiopulmonar por hantavirus"**, que requiere internación urgente.

¿Cuál es el tratamiento?

No existe tratamiento específico. Las personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser internados de urgencia y recibir asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo puede prevenirse?

- Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.
- Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.
- Realizar la limpieza con 1 parte de lavandina cada 9 de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.
- Colocar huertas y leña a más de 30 mts de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio.
- Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados. Cubrirse la boca y la nariz con un barbijo N95 antes de ingresar.
- Acampar lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.
- Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o trampas para capturarlo. Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de plagas.
- Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.
- Las personas que presenten síntomas de la enfermedad deben concurrir rápidamente a un establecimiento de salud para la consulta y evitar el contacto estrecho con otras personas.

